

## Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes oder des Apothekers bzw. der Ärztin oder der Apothekerin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

# OMIDA Bronchialhusten Globuli

## Homöopathisches Arzneimittel

### Wann werden die OMIDA Bronchialhusten Globuli angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können die OMIDA Bronchialhusten Globuli bei Bronchialhusten mit zähem, schwer löslichem Schleim infolge Erkältungskrankheiten angewendet werden.

### Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob die OMIDA Bronchialhusten Globuli gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Bei Kindern unter 2 Jahren nur nach ärztlicher Verordnung anwenden.

Bei Husten, der länger als 7 Tage anhält, muss ein Arzt oder ein Apotheker bzw. eine Ärztin oder eine Apothekerin beigezogen werden.

### Wann dürfen die OMIDA Bronchialhusten Globuli nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Bis heute sind keine Anwendungseinschränkungen bekannt. Bei bestimmungsgemäsem Gebrauch sind keine besonderen Vorsichtsmassnahmen notwendig.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Sie

– an andern Krankheiten leiden,

– Allergien haben oder

– andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte!) einnehmen oder äusserlich anwenden!

### Dürfen die OMIDA Bronchialhusten Globuli während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen werden?

Auf Grund der bisherigen Erfahrungen ist bei bestimmungsgemässer Anwendung kein Risiko für das Kind bekannt. Systematische wissenschaftliche Untersuchungen wurden aber nie durchgeführt. Vorsichtshalber sollten Sie während der Schwangerschaft und Stillzeit möglichst auf Arzneimittel verzichten oder den Arzt oder den Apotheker bzw. die Ärztin oder die Apothekerin um Rat fragen.

### Wie verwenden Sie die OMIDA Bronchialhusten Globuli?

Falls vom Arzt oder der Ärztin nicht anders verschrieben 5–10 Globuli 3–4 mal täglich einnehmen, bei akuten Beschwerden bis zum Eintritt einer Besserung bis zu stündlich 5–10 Globuli einnehmen.

Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker bzw. mit Ihrer Ärztin oder Apothekerin.

### Welche Nebenwirkungen können die OMIDA Bronchialhusten Globuli haben?

Für die OMIDA Bronchialhusten Globuli sind bisher bei bestimmungsgemäsem Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht beschrieben sind, sollten Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin informieren.

Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie die OMIDA Bronchialhusten Globuli ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

### Was ist ferner zu beachten?

Bei Zimmertemperatur (max. 25 °C) und vor Kindern geschützt aufbewahren. Das Arzneimittel darf nur bis zum auf dem Behälter mit <EXP.> bezeichneten Datum verwendet werden.

### Was ist in den OMIDA Bronchialhusten Globuli enthalten?

Globuli aus Saccharose, imprägniert mit:

Sanguinaria canadensis (Kanadische Blutwurz) D4 33,3%; Kalium chloratum (Kaliumchlorid) D6 33,3%; Tartarus stibiatus (Kalium stibyltartaricum/Brechweinstein) D6 33,3%.

56096 (Swissmedic).

### Wo erhalten Sie die OMIDA Bronchialhusten Globuli? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Fläschchen zu 12.5 g



### Zulassungsinhaber / Produzentin

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

**OMIDA**

Diese Packungsbeilage wurde im Juli 2002 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

## Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin ou du pharmacien.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

# Globules OMIDA contre la toux bronchique

## Médicament homéopathique

### Quand les globules OMIDA contre la toux bronchique sont-ils utilisés?

Selon la conception homéopathique, les globules OMIDA contre la toux bronchique peuvent être utilisés en cas de toux bronchique accompagnée de glaires opiniâtres difficilement solubles à la suite d'un refroidissement.

### De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les globules OMIDA contre la toux bronchique peuvent être pris simultanément.

Pour les enfants de moins de 2 ans, la prise n'est autorisée que sur ordonnance médicale.

En cas de toux persistant pendant plus de 7 jours, veuillez consulter un médecin ou un pharmacien.

### Quand les globules OMIDA contre la toux bronchique ne doivent-ils pas être utilisés ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si

– vous souffrez d'une autre maladie,

– vous êtes allergique,

– vous prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

## **Les globules OMIDA contre la toux bronchique peuvent-ils être pris pendant la grossesse ou l'allaitement?**

Sur la base des expériences faites à ce jour, aucun risque pour l'enfant n'est connu si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Toutefois, aucune étude scientifique systématique n'a été effectuée. Par mesure de précaution, vous devriez renoncer si possible à prendre des médicaments durant la grossesse et l'allaitement ou demander l'avis du médecin ou du pharmacien.

## **Comment utiliser les globules OMIDA contre la toux bronchique?**

Sauf prescription contraire du médecin, prendre 5–10 globules 3–4 fois par jour. En cas de troubles aigus, augmenter la dose à 5–10 globules par heure jusqu'à perception d'une amélioration.

Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

## **Quels effets secondaires les globules OMIDA contre la toux bronchique peuvent-ils provoquer?**

L'emploi approprié des globules OMIDA contre la toux bronchique n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les globules OMIDA contre la toux bronchique et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

## **A quoi faut-il encore faire attention?**

Conserver à température ambiante (25° C au maximum) et hors de la portée des enfants. Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date indiquée sur le récipient par la mention «EXP.».

## **Que contiennent les globules OMIDA contre la toux bronchique ?**

Globules de saccharose imprégnés de :

Sanguinaria canadensis (sanguinaire du Canada) D4 33,3%; Kalium chloratum (chlorure de potassium) D6 33,3%; Tartarus stibiatu (Kalium stibyltartaricum/émétique d'antimoine) D6 33,3%.

56096 (Swissmedic)

## **Où obtenez-vous les globules OMIDA contre la toux bronchique? Quels sont les emballages à disposition sur le marché ?**

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale. Flacons de 12.5 g.



**Titulaire de l'autorisation / Fabricant**

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

**OMIDA**

Cette notice d'emballage a été contrôlée par l'autorité des médicaments (Swissmedic) en juillet 2002.

## *Informazioni per i pazienti*

Legga attentamente questo foglietto illustrativo. Vi troverà importanti informazioni concernenti il medicamento.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico oppure le è stato consegnato senza prescrizione medica dal farmacista o dal droghiere. Per trarne il massimo beneficio lo utilizzi conformemente al foglietto illustrativo oppure segua le indicazioni del medico o del farmacista.

Conservi questo foglietto illustrativo per poterlo leggere nuovamente più tardi, se mai fosse necessario.

# **Globuli OMIDA contro la tosse bronchiale**

## *Medicamento omeopatico*

### **Quando vengono usati i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale?**

Secondo la concezione omeopatica i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale possono essere usati in caso di catarro denso che si scioglie difficilmente, in seguito a malattie da raffreddamento.

### **Di che cosa si deve tener conto durante il trattamento?**

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chiedi al suo medico o al farmacista, se i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale possono essere presi contemporaneamente.

Per i bambini di meno di 2 anni somministrare solo su prescrizione medica.

Se la tosse dura per più di 7 giorni, si deve consultare il farmacista o il medico.

### **Quando non si devono usare i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale o quando la loro somministrazione richiede prudenza?**

Ad oggi non è nota nessuna limitazione all'impiego. Se il medicamento viene usato conformemente all'uso a cui è destinato, non è necessaria nessuna precauzione particolare.

Informi il suo medico, il farmacista o il droghiere se

– soffre di altre malattie,

– fosse allergico oppure

– se prendesse altri medicinali per uso interno o esterno (anche se in autoprescrizione)!

### **I globuli OMIDA contro la tosse bronchiale possono essere somministrati durante la gravidanza o l'allattamento?**

Sulla base delle esperienze fatte sino ad oggi, non è noto nessun rischio per il bambino se il medicamento viene usato conformemente all'uso al quale è destinato. Tuttavia non è stato mai effettuato nessuno studio sistematico. Per precauzione dovrebbe rinunciare a prendere dei medicinali durante la gravidanza e l'allattamento, oppure chiedi il parere del medico o del farmacista.

### **Come usare i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale?**

Salvo diversa prescrizione medica prendere da 3 a 4 volte al giorno 5–10 globuli, in caso di disturbi acuti ogni ora da 5 a 10 globuli sino a quando si ha un miglioramento.

Si rivolga al suo medico o al suo farmacista se pensa che l'effetto del medicamento sia troppo debole oppure troppo forte.

### **Quali effetti collaterali possono avere i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale?**

Non si sono finora osservati effetti collaterali in seguito all'impiego corretto dei globuli OMIDA contro la tosse bronchiale.

Se dovesse notare degli effetti collaterali, la preghiamo di informare il suo medico o il suo farmacista.

Dopo l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere, interrompa il trattamento con i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale e informi il suo medico, farmacista o droghiere.

### **Di che altro bisogna tener conto?**

Conservare il medicinale a temperatura ambiente (massimo 25 °C) e lontano dalla portata dei bambini. Si può usare il medicamento solo fino alla data di scadenza indicata con «EXP.» sulla confezione.

### **Che cosa contengono i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale?**

Globuli di saccarosio impregnati di:

Sanguinaria canadensis (sanguinaria) D4 33,3%; Kalium chloratum (cloruro di potassio) D6 33,3%; Tartarus stibiatu (Kalium stibyltartaricum/tartaro emetico) D6 33,3%.

56096 (Swissmedic)

### **Dove sono ottenibili i globuli OMIDA contro la tosse bronchiale? Quali confezioni sono disponibili?**

In farmacia e drogheria, senza prescrizione medica. Flaconi da 12.5 g.



**Distributore / Produzione**

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

**OMIDA**

Questo foglietto illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nell'luglio 2002 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).