

Information für Patientinnen und Patienten

Lesen Sie diese Packungsbeilage sorgfältig, denn sie enthält wichtige Informationen.

Dieses Arzneimittel haben Sie entweder persönlich von Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin verschrieben erhalten, oder Sie haben es ohne ärztliche Verschreibung in der Apotheke oder Drogerie bezogen. Wenden Sie das Arzneimittel gemäss Packungsbeilage beziehungsweise nach Anweisung des Arztes, des Apothekers oder des Drogisten bzw. der Ärztin, der Apothekerin oder der Drogistin an, um den grössten Nutzen zu haben.

Bewahren Sie die Packungsbeilage auf, Sie wollen sie vielleicht später nochmals lesen.

OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder

Homöopathisches Arzneimittel

Wann werden OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder angewendet?

Gemäss homöopathischem Arzneimittelbild können OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder bei häufigem Harnabgang, auch in der Nacht, Blasenschwäche bei Jugendlichen und Reizblase angewendet werden.

Was sollte dazu beachtet werden?

Wenn Ihnen Ihr Arzt oder Ihre Ärztin andere Arzneimittel verschrieben hat, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin, ob OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder gleichzeitig eingenommen werden dürfen.

Wann dürfen OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder nicht oder nur mit Vorsicht angewendet werden?

Blasenschwäche kann viele Ursachen haben. Erkältungen, nervöse Störungen oder seelische Konflikte können solche Beschwerden auslösen. Bei wiederkehrenden oder andauernden Beschwerden und wenn Fieber auftritt ist ärztlicher Rat einzuholen.

Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin, wenn Ihr Kind

- an anderen Krankheiten leidet,
- Allergien hat oder
- andere Arzneimittel (auch selbstgekaufte) einnimmt oder äusserlich anwendet!

Wie verwenden Sie OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder

Falls vom Arzt bzw. von der Ärztin nicht anders verschrieben bei Kleinkindern bis 5 Jahre 3–5 Chügeli vor dem Schlafengehen und bei Kindern bis 16 Jahre 5–10 Chügeli vor dem Schlafengehen. Halten Sie sich an die in der Packungsbeilage angegebene oder vom Arzt oder von der Ärztin verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Arzneimittel wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. mit Ihrer Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Welche Nebenwirkungen können OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder haben?

Für OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder sind bisher bei bestimmungsgemässen Gebrauch keine Nebenwirkungen beobachtet worden. Wenn Sie dennoch Nebenwirkungen beobachten, informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ärztin, Apothekerin oder Drogistin. Bei Einnahme von homöopathischen Arzneimitteln können sich die Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). Bei andauernder Verschlechterung setzen Sie OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder ab und informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist ferner zu beachten?

Das Arzneimittel darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «EXP.» bezeichneten Datum verwendet werden.

Das Arzneimittel für Kinder unzugänglich und bei Raumtemperatur (15 – 25 °C) aufbewahren.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist bzw. Ihre Ärztin, Apothekerin oder Drogistin.

Was ist in OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder enthalten?

Atropa belladonna (Tollkirsche) D12 25%, Causticum Hahnemanni (Ätzstoff) D6 25%, Gelsemium sempervirens (Gelber Jasmin) D6 25%, Kalium phosphoricum (Kaliumdihydrogenphosphat) D6 25%.

Dieses Präparat enthält als Hilfsstoff Xylit.

Zulassungsnummer:

57064 (Swissmedic)

Wo erhalten Sie OMIDA® Blasenschwächechügeli für Kinder? Welche Packungen sind erhältlich?

In Apotheken und Drogerien, ohne ärztliche Verschreibung.

Packungen à 10 g Globuli.



Zulassungsinhaber:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

OMIDA

Diese Packungsbeilage wurde im März 2005 letztmals durch die Arzneimittelbehörde (Swissmedic) geprüft.

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament.

Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien ou le droguiste. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications du médecin, du pharmacien ou du droguiste.

Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

OMIDA® faiblesse de vessie granules pour enfants

Médicament homéopathique

Quand les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants sont-ils utilisés?

Selon la conception homéopathique, les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants sont utilisés en cas de mictions fréquentes, même la nuit, de faiblesse de vessie chez l'adolescent et de vessie irritable.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants peuvent être pris simultanément.

Quand les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants ne doivent-ils pas être pris ou seulement avec précaution?

De multiples causes peuvent être à l'origine d'une faiblesse de vessie. Par exemple des refroidissements, des troubles nerveux ou affectifs. En cas de troubles fréquents ou durables de même qu'en cas fièvre, il convient de consulter un médecin.

Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste si l'enfant

- souffre d'une autre maladie,
- est allergique,
- prend déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Comment utiliser les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants?

Sauf prescription contraire du médecin: enfants jusqu'à 5 ans: 3–5 granules au coucher; enfants jusqu'à 16 ans: 5–10 granules au coucher. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou à votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants peuvent-ils provoquer?

L'emploi approprié des granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez d'effets secondaires, veuillez en informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement aux granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants et informez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP.» sur le récipient. Conserver le médicament à température ambiante (15–25 °C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste.

Que contiennent les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants?

Atropa belladonna D12 25%, Causticum Hahnemanni D6 25%, Gelsemium sempervirens D6 25%, Kalium phosphoricum D6 25%. Le produit contient du xylitol comme substance adjuvante.

Numéro d'autorisation:

57064 (Swissmedic)

Où obtenez-vous les granules OMIDA® faiblesse de vessie pour enfants? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie et en droguerie, sans ordonnance médicale.

Emballage granules de 10 g.



Titulaire de l'autorisation:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

Cette notice d'emballage a été contrôlée par les autorités des médicaments (Swissmedic) en mars 2005.

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo perché contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Faccia uso corretto del medicamento o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere, al fine di ottenere il maggior beneficio.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

Globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini

Medicamento omeopatico

Che cosa sono i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini e quando li si usano?

Secondo la concezione che sta alla base dei medicinali omeopatici i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini possono essere usati in caso di minzione frequente, anche di notte, debolezza della vescica nei ragazzi e vescica irritabile.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicinali, chieda al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere se simultaneamente può assumere i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini.

Quando non si possono usare i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini e quando la sua somministrazione richiede prudenza?

La debolezza della vescica può avere diverse cause. Raffreddamenti, disturbi nervosi o conflitti psichici possono essere la causa di questi problemi. Se il problema si ripresenta di frequente o dura a lungo e in caso di febbre rivolgersi al medico.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere se il bambino

– soffre di altre malattie,

– soffre di allergie

– assume altri medicinali o fa uso di medicinali per uso esterno (anche acquistati di propria iniziativa)!

Come usare i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini?

Salvo diversa prescrizione medica per i bambini sino ai cinque anni da 3 a 5 globuli prima di andare a dormire o per i bambini sino ai 16 anni da 5 a 10 globuli prima di andare a dormire. Si attenga alla posologia indicato nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se pensa che il medicamento agisca in modo troppo debole o troppo forte, ne parli con il medico, il farmacista o il droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini?

Finora non sono stati osservati effetti collaterali in seguito all'uso corretto di globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini. Se osserva effetti collaterali, dovrebbe informare il suo medico, suo farmacista o il suo droghiere. Con l'assunzione di medicinali omeopatici, i disturbi possono momentaneamente aggravarsi (aggravamento iniziale). Se l'aggravamento dovesse persistere interrompa il trattamento con i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini e informi il suo medico, farmacista o il suo droghiere.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP.» sulla confezione.

Conservare il medicinale a temperatura ambiente (15–25 °C) e lontano dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni si rivolga al medico, al farmacista o al droghiere.

Che cosa contengono i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini

Atropa belladonna D12 25%, Causticum Hahnemanni D6 25%, Gelsemium sempervirens D6 25%, Kalium phosphoricum D6 25%. Questo preparato contiene xilitolo come eccipiente.

Numero dell'omologazione:

57064 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili i globuli OMIDA® debolezza della vescica per i bambini?

Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Confezioni da 10 g globuli.



Titolare dell'omologazione:

OMIDA AG, 6403 Küssnacht a.R.

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel marzo 2005 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).